

ACTIVITÉ DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE VALAISAN EN 1979 ET 1980

par Raphaël Arlettaz ¹ et Geneviève Tenthorey ¹

Cet article a pour but d'établir une synthèse des différentes observations des ornithologues valaisans. Pour simplifier notre tâche, ce compte-rendu exclut les données des naturalistes non-domiciliés en Valais, données qui sont traitées par les différents organismes ornithologiques helvétiques (Station ornithologique suisse de Sempach, Chronique ornithologique romande, etc.).

Nous avons réorganisé la structure du collationnement par rapport à 1978; pour faciliter la lecture, les observations sont réunies sous trois thèmes essentiels: hivernage, migration et erratisme, indices de nidification. Le texte perd ainsi son fastidieux aspect littéraire.

Chaque observation est suivie des initiales ou du nom complet de l'auteur: FC = F. CATZEFLIS, RD = R. DELSETH, NJ = N. JORDAN, RL = R. LUGON, PAO = P.-A. OGGIER, SP = S. PELLAUD, JCP = J.-Cl. PRAZ, PR = P. RODUIT, GT = G. TENTHOREY, RV = R. VOISIN, RA = R. ARLETTAZ, SV = S. VENTURI, COL = Cercle ornithologique de Lausanne.

Quelques notes, extraites de la Chronique ornithologique romande de P. GÉROUDET (Nos Oiseaux, mars 1980) complètent ce matériel individuel.

Hiver 1978-79

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*): hivernage très réduit à nul sur les canaux de la basse-plaine du Rhône (G. Gillieron). Héron cendré (*Ardea cinerea*): 25 sur 60 km entre Villeneuve et St-Maurice le 27 février (FC). Oie des moissons (*Anser fabalis*): 11 adultes dont 1 tirée par des chasseurs le 4 janvier à Illarsaz/Vouvry (FC). Oie rieuse (*Anser albifrons*): 1 le 3 janvier à Aproz, puis les 5 et 6 à Chamoson (RL, SP). Oie cendrée (*Anser anser*): 2 dont 1 tirée, le 2 janvier à Turtmann (H. de Roten). Harle bièvre (*Mergus merganser*): 5 le 7 janvier à Grône (SP); 8 le 24 janvier, au vol, à Fully, puis à nouveau 8, probablement les mêmes, le 28 à Branson (RA).

Milan royal (*Milvus milvus*): 1 le 31 janvier à Fully (PR), apparition plutôt rare chez nous en hiver. Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): les observations très nombreuses cet hiver attestent un afflux d'hivernants remarquable: dans la région de Fully, plus de 30 observations ont été faites du 10 décembre au 5 mai. On notera que les mâles adultes sont peu nombreux: 1 le 17 février à Martigny (RA); le 14 février 2 individus en livrée femelle ou juvénile chassent sur le coteau de Saillon-Fully à 1300 m d'altitude (RA). Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*): entre autres: 2 sur la plaine d'Illarsaz le 31 décembre (NJ).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 1 le 9 décembre à Martigny (RA), seule donnée hivernale. Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*): 1 hivernant exceptionnel le 21 décembre à Sion (FC). Mouette rieuse (*Larus ridibundus*): hivernage de plus en plus régulier en Valais: du 7 au 31 janvier, 250-300 individus fréquentent l'usine d'incinération d'ordures à Grône et repartent chaque soir vers l'aval (RL, SP). Goéland cendré (*Larus canus*): avec les Mouettes de Grône 15 à 20 individus en janvier (RL, SP).

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): alors que l'hivernage de l'espèce fut, semble-t-il, nul, le passage de 40 le 8 mars à Fully marque le début des arrivées (RA). Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*): 1 mâle hivernant à Beudon-Fully (RA). Merle sibérien (*Zoothra sibirica*): 1 mâle le 8 décembre à Collombey (A. Calloz, RV). 1^{re} observation de l'espèce en Suisse! La Commission de l'Avifaune Suisse l'a d'ailleurs homologuée. Notons que l'oiseau se reproduit exclusivement en Sibérie orientale et centrale; ses quartiers d'hiver s'étendent sur tout le sud-est asiatique. Des apparitions accidentelles, très rares, sont connues jusqu'en Europe occidentale (P. Géroutet). Grive mauvis (*Turdus iliacus*): 1 le 19 février à Charrat, annonce peut-être déjà le retour printanier (RA). Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*): aucune trace d'hivernage dans la région de Fully.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*): 4 observations dans la région de Fully (15 et 19 novembre, 13 et 21 janvier) ne prouvent pas l'hivernage de l'espèce (RA, PR). Crave à bec rouge (*Pyrhacorax pyrrhacorax*): 1 couple le 6 janvier à Saillon, attaqué par deux Eperviers (RA). Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*): des hivernantes sont notées à Agarn, Bramois et Martigny. Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*): maximum de 100 individus le 31 janvier à Vétroz (RL, SP). Venturon montagnard (*Serinus citrinella*): petits groupes d'hivernants ou isolés à Agarn, Maladeire, Chamoson et Fully (RA, RL, SP). Verdier (*Carduelis chloris*): à noter: 12 le 1^{er} janvier à Kalpetran (1800 m!) (J. Strahm). Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*): beaucoup plus abondant que durant l'hiver 1977-78: 6 en janvier à Vex (C. Geyer), 22 le 27 février à Fully (RA, SP). Bruant zizi (*Emberiza cirrus*): une trentaine en décembre à Vétroz et 4 à Sion (RL, SP). Bruant fou (*Emberiza cia*): entre autres: 2 le 28 décembre à Kalpetran, 1800 m (J. Strahm); 3 le 27 à 1700 m sur Verbier (RA).

Migration et erratisme, printemps-automne 1979

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*): 1 les 18 et 28 août à Poutafontana (RL); 1 ind. en plumage nuptial sur le Rhône à Branson le 5 mai (RA). Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*): 1 le 16 septembre à Grône (RL); 1 les 16 et 17 août à Martigny (RA, PR). Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*): 2 immatures le 8 avril sur le Rhône à Susten-Leuk (GT). Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*): 1 les 17 et 18 août à Grône (RL); 1 adulte le 19 avril à Agarn (RA); 2 adultes au même endroit les 26 et 27 mai (FC). Héron crabier (*Ardeola ralloides*): 2-3 les 26 et 27 mai à Agarn (FC). Aigrette garzette

(*Aigretta garzetta*): 5 à 6 les 26-27 mai à Martigny (RA, PR); 1 le 26 mai et 3 le 2 juin à Agarn (FC). Héron cendré (*Ardea cinerea*): 1 migrateur sur un alpage du Val Ferret à 2000 m le 28 juillet (RA, SP). Héron pourpré (*Ardea purpurea*): 1 hâtif le 4 avril à Fully (RA); 2 le 18 avril à Agarn (Sortie Murithienne); 1 le 19 mai à Saillon (PR). Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*): 2 le 14 juin à Riddes (RL); 20 le 22 août à Oberwald (Presse); 5, dont 2 baguées, en septembre à Martigny (GT). Cigogne noire (*Ciconia nigra*): 1 adulte le 16 août à Uvrier (RL). Flamant rose (*Phoenicopterus ruber*): 1 individu non bagué le 13 novembre sur les bords du Rhône à Monthey (RV). S'agit-il d'un échappé de captivité?

Canard siffleur (*Anas penelope*): 1 du 10 au 17 octobre à Grône (RL). Canard chipeau (*Anas strepera*): 4 le 14 mars Fully (RA, PR). Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): 1 couple le 20 juin aux Iles de Sion (J.-Cl. Praz). Sarcelle d'été (*Anas querquedula*): 1 couple le 22 mars à Fully (RA). Nette rousse (*Netta rufina*): 1 couple le 7 avril à Grône (SP); 2 le 10 mars sur le Rhône à Fully (RA). Harle bièvre (*Mergus merganser*): 1 mâle le 4 mars à Susten (RL, SP).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*): première observation de l'année le 11 mai à Fully (RA). Milan noir (*Milvus migrans*): premier le 8 mars aux Follatères (RA). Milan royal (*Milvus milvus*): 1 le matin du 6 mai aux Follatères et à Martigny, c'est probablement le même qui vole l'après-midi sur Fully (RA, PR). Circaète (*Circaetus gallicus*): 1 les 13 et 16 avril à Branson-Fully (RA). Observation homologuée par la commission de l'avifaune suisse. Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*): 1 le 22 avril à Agarn; 1 le 27 avril migre vers l'aval, St-Maurice (RA); 1 femelle adulte le 28 avril à Grône (FC); 1 mâle le 31 octobre à Branson (PR). Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): 1 mâle le 9 octobre à St-Maurice (PR). Busard cendré (*Circus pygarcus*): 2 le 30 septembre à Bretolet (PR). Balbuzard fluviatile (*Pandion haliaetus*): 1 le 11 avril à Grône (FC); 2 passant le 8 septembre au Col de Balme à 2 heures d'intervalle (RL, SP). Faucon kobez (*Falco vespertinus*): 1 mâle le 12 mai à Fully (PR); plusieurs probables attaquent un Hobereau (*Falco subbuteo*) le 8 septembre à Branson et 1 mâle migre le 24 septembre à Bretolet (PR). Faucon émerillon (*Falco columbarius*): 1 le 24 septembre à Bretolet (PR) puis le premier migrateur automnal le 10 octobre au Val Ferret (R. Hauri). Faucon hobereau (*Falco subbuteo*): individus isolés les 28 avril et 6 mai à Fully (PR) puis en automne 6 observations entre le 4 août et le 30 septembre (RA, PR).

Pluvier guignard (*Charadrius morinellus*): 2 le 29 août au Sanetsch, 2500 m (RL, SP). Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): 26 le 7 mars à Martigny (PR); 60 le 11 mars et 80 le 12 à Vétroz (RL); 1 isolé en septembre à Châteauneuf (J.-Cl. Praz). Bécasseau minute (*Calidris minuta*): 1 migrateur le 24 juin au bord d'une gouille de fonte, à Sorniot/Fully, 2000 m (RA). Bécasseau sp. (*Calidris species*): 1 le 7 octobre au barrage d'Emosson (Sortie Murithienne). Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 1 le 14 septembre à Arbey/Evolène, 2000 m! (C. Geyer). Courlis cendré (*Numenius arquata*): 2 passent au col de Bretolet dans la nuit sombre du 8 au 9 août (FC). Chevalier gambette (*Tringa totanus*): 1 du 9 au 14 avril et 1 présent le 21 à Saillon (RA, PR). Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*): 1 le 3 septembre à Fully (PR) et 2 du 5 au 9 septembre à Martigny (RA). Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*): 1 le 24 mars aux Follatères (RA); 1 le 21 avril à Saillon et 1 isolé le 26 juin à Fully (PR). Cris nocturnes dans la nuit du 7 au 8 août au col de Bretolet (FC). Maximum de 6 le 16 août à Martigny (RA), puis 1 à 3 du 27 août au 3 septembre (PR). Chevalier sylvain (*Tringa glareola*): individus isolés les 12 avril à Fully; 18 avril à Agarn et 21 avril à Saillon; au moins 11 migrent à Bretolet dans la nuit du 8 au 9 août (FC); 1 le 17 août aux Follatères (PR).

peut-être 1 des 3 présents le 16 à Martigny (RA). Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*): passage nocturne du 6 au 9 août à Bretolet (FC); les migrateurs sont très nombreux en mai, juin et août au bord du Rhône et dans les gravières: max. de 6 le 16 août à Martigny. Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*): 1 adulte en phase claire survole un glacier à 3200 m près d'Arolla le 16 septembre (SP) extraordinaire! Guifette noire (*Chlidonias niger*): 1 le 12 mai à Grône (SP); 1 juvénile les 1^{er} et 2 août à Grône également (FC). Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*): 1 isolée le 16 août à Grône (RL).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*): 30 individus marquent le début du passage le 7 mars à Fully (RA). Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*): 1 très hâtive le 12 avril à Fully (RA). Coucou gris (*Cuculus canorus*): 1^{er} le 17 avril à Finges (RA, PAO). Hibou petit dut (*Otus scops*): 1 probable chanteur le 5 mai à Branson (A. Ducrey, PR). Hibou des marais (*Otus flammeus*): 1 du 21 au 23 avril à Fully. Le 22 il chante en plein labour, attaque des Bergeronnettes printanières et se fait houspiller par 4 Corneilles (RA, PR)! Huppe (*Upupa epops*): 1^{er} le 28 mars à Fully (PR) et dernière le 10 septembre à Martigny (RA). Torcol (*Jynx torquilla*): 1^{er} le 29 mars à Conthey (RL, SP).

Alouette lulu (*Lulula arborea*): 1 chanteur le 10 mars à Fully, premier arrivant (RA). Alouette des champs (*Alauda arvensis*): 1^{er} chanteur le 19 février à Charrat (RA). Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*): 1^{re} le 31 mars à Fully (RA). Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*): 1^{re} le 18 mars aux Follatères (RA). Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*): 1^{re} le 23 mars à Branson (RA). Pipit rousseline (*Anthus campestris*): 1^{er} le 24 avril à Fully où RA en dénombre au moins 80 sur 5 km de digue longeant le Rhône, le 5 mai. Pipit des arbres (*Anthus trivialis*): 1^{er} le 7 avril à Fully. Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*): des hivernants tardifs en plaine le 13 mai à Fully (RA).

Gorgebleue (*Luscinia svecica*): 1 le 8 avril à Agarn, en halte migratoire (C. Bottani, SP). Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*): plusieurs arrivent entre le 12 et le 17 mars. La migration se fait très nettement sentir vers le 20 mars et durant une ou deux semaines (RA). Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*): en altitude: 1 le 15 septembre à la Bella Tola, 2750 m (A. Glannaz). Traquet tarien (*Saxicola rubetra*): 1^{er} le 18 avril à Agarn (GDJ, VS). Traquet pâle (*Saxicola torquata*): 1^{er} le 26 février à Fully (RA); du 12 à fin mars, un faible passage est noté dans des biotopes tout-à-fait étrangers à l'espèce: cultures intensives et maraîchères ou même cordons d'arbres. Merle de roche (*Monticola saxatilis*): 1^{er} le 7 mai aux Follatères (RA). Locustelle luscinioloïde (*Locustella luscinioides*): 1 le 9 avril à Agarn (RL). Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*): un le 4 mai à Saillon (PR). Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*): un isolé le 6 mai aux Follatères (PR). Fauvette pitchou (*Sylvia undata*): 1 individu le 27 mars à Fully, sur les berges du Rhône. L'incursion de l'espèce au nord des Alpes est accidentelle. Homologation de la part de la Commission de l'Avifaune Suisse (GT). Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*): 1 couple le 21 août à Fully au bord du Rhône (PR). Sous réserve d'homologation. Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*): première le 13 avril à Fully (RA).

Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*): 1 mâle le 26 avril à 800 m aux Follatères; l'autre mâle en plumage nuptial inspecte les infractuosités d'un pont le 7 mai aussi aux Follatères, 450 m (RA). Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*): première le 5 mai à Fully (RA). Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*): première le 5 avril à Vétroz (RL, SP); 1 le 7 mai à Vernayaz ne reste pas malgré un biotope favorable. Cassenoix (*Nucifraga caryocatactes*): 3 individus les 29 et 30 juillet dans un jardin de la ville de Sion (FC); 2 le 16 août au bord du Léman près de St-Gingolph, probablement descen-

dus aux noisettes (J. Burnier). Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): 17 le 21 mars en plaine d'Agarn pâturant dans les prairies (SP); 6 le 11 avril à Chamoson (RA, RL, SP); 2 le 22 avril à Brigue (R. Hauri); 1 le 31 août à 2000 m au Sanetsch (RL, SP). Corbeau freux (*Corvus frugilegus*): à noter des vols migratoires maximums de 120 le 8 novembre et de 110 le 11 à Fully (SV). Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*): entre autres: 1 le 18 août à St-Maurice (F. Estoppey). Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*): dernier le 31 mars à Saillon (RA). Venturon montagnard (*Serinus citrinella*): attardés jusqu'au 13 mai en plaine; le 20 juin un mâle parade, la femelle picore des grains de gravier, à Branson. Une expansion de l'espèce vers la plaine, parallèle à celle du Sizerin, est-elle possible? (RA). Bruant zizi (*Emberiza cichus*): premiers le 21 février à Branson (RA).

Printemps et été 1979: indices de nidification

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*): 1nidification probable à Agarn (RL, SP). Sarcelle d'été (*Anas querquedula*): 1 couple du 11 avril à fin mai à Grône; semble avoir tenté de nicher? (FC).

Buse variable (*Buteo buteo*): entre autres: 1 nid à Collonges avec 1 jeune le 30 juin (RD). Faucon hobereau (*Falco subbuteo*): la présence d'un individu le 1^{er} juillet à Finges est peut-être à rapprocher d'une éventuelle nidification? (PR).

Caille des blés (*Coturnix coturnix*): les 26 et 27 mai, 4 chanteurs pour une surface de 10 hectares à Agarn. Autre estimation à 5 km de ce secteur: 5-6 ind.km² (FC).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*): couples nicheurs présents dès le 27 mars à Finges (FC). Petit gravelot (*Charadrius dubius*): l'espèce a niché à deux reprises dans une gravière d'extraction de matériau pour l'autoroute à Martigny (nouveau site); le 19 juillet, un poussin à peine capable de voler, issu d'une seconde ponte, y est observé (PA, PR).

Chouette effraie (*Tyto alba*): présence d'un individu au moins dans la région de Chippis/Chalais en avril et juillet (FC); 1 exemplaire de phase rousse le 25 avril à Saxon (A. Ducrey, PR). Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*): 1 couple nicheur aux étangs de Finges, observé de mi-avril jusqu'en juin (FC). Huppe fasciée (*Upupa epops*): au minimum 20 couples nicheurs sur 10 km entre les Follatères et Saillon, soit 14 entre 500 et 800 m d'altitude et 6 en plaine: distance minimale entre deux nids: 500 m. 5 sites de nids découverts, 5-7 localisés. Il s'agit certainement d'une des populations de Suisse les plus stables à l'heure actuelle (RA).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*): famille à 2 jeunes le 12 juillet à Agarn, probablement toujours le seul site où l'espèce se reproduit régulièrement en Valais (RL). Traquet pâle (*Saxicola torquata*): le cantonnement de la plupart des couples fut grandement perturbé par la période de froid qui sévit en mars-avril. Souvent, les traquets pâtres disparurent pour ne réparaître qu'avec les premiers jours de mai. Les rares couples qui avaient bravé les intempéries ne purent élever de nichées avant cette date (RA). Rossignol philomène (*Luscinia megarhynchos*): le 26 juillet aux Follatères, une Vipère aspic, *Vipera aspis*, capture un jeune Rossignol, proie pour le moins inhabituelle! (RA, RL, SP). Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*): en période de reproduction: 3 couples avec mâles chanteurs aux étangs d'Agarn (FC). Hypolaïs polyglotte (*Hypolaïs polyglota*): 1 couple nicheur à Martigny, puis deux chanteurs en juin à Fully: un dans une châtaigneraie buissonnante, l'autre en lisière de chênaie; comme dans le canton de Genève, l'expansion de l'espèce se poursuit en Valais (RA).

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*): 2 à 3 couples ont niché à Uvrier, 4 à Vétroz; sur 6 nids découverts dans ces deux sites, 2 sont construits puis délaissés, 2 pontes à 5 œufs abandonnées. Seules deux nichées réussirent, soit une ponte à 4 l'autre à 5 œufs. Le premier jeune éclot le 15 juin (RL, SP); le statut de cette espèce devient de plus en plus dramatique dans nos régions, une disparition à court terme est à craindre. Crave à bec rouge (*Pyrhcorax pyrrhcorax*): la nidification de ce corvidé a été particulièrement suivie cet été: famille à 4 jeunes le 28 juillet au Val Ferret; 6 jeunes dans la région de Louvie le 23 juillet. Présence des jeunes, indépendants, 8 jours plus tard au-dessus de Sarreyer; à Leytron, le 25 juin et 16 juillet les adultes nourrissent au nid et le 22 juillet ils arpentent les pâturages avec au moins 3 jeunes (RA, RL, SP). Bruant proyer (*Miliaria calandra*): 10 chanteurs sur 1 km² le 26 mai à Agarn (FC); 1 chanteur à Charrat durant plusieurs semaines, disparaît par la suite (RA).

Hiver 1979-1980

Busard St-Martin (*Circus cyaneus*): l'hivernage est à nouveau assez répandu en plaine: 1 couple dans la basse-plaine du Rhône du 11 novembre 1979 à mai 1980 (RD, RV); le 31 décembre, NJ observe le couple et un indiv. isolé; 4 à 5 hivernants entre Dorénavant et Saillon, la plupart des fem. ou juv., un mâle adulte le 12 janvier à Saillon (PR); le dernier est observé le 7 avril à 1200 m au-dessus de Fully (RA, SV, PR); 1 fem. ou juv. sur les pentes sèches au-dessus d'Ardon le 19 janvier (NJ). Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*): 1 le 2 décembre en vol crépusculaire à Branson (RA).

Mouette rieuse (*Larus ribibundus*): relevons la présence de 20 indiv. le 17 décembre à Brigue (J. Strahm), tandis que celle d'environ 250 en janvier à Grône est confirmée par RL.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*): dortoir de 15 à 20 indiv. aux Follatères (RA, PR). Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*): entre autres: 1 hivernant à Fully/Saillon (RA).

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*): quelques hivernants le long des canaux à Saillon (RA). Bergeronnette grise (*Motacilla alba*): 4 observations d'individus isolés entre le 20 décembre et le 19 janvier (Martigny/Fully) attestent un meilleur hivernage qu'en 1978-79 (RA). Accenteur alpin (*Prunella collaris*): 1^{ers} en plaine le 25 novembre aux Follatères (RA). Merle à plastron (*Turdus torquatus*): 1 mâle hivernant le 29 décembre sur l'alpage de Pléna Dzeu/Lourtier à 1600 m! (RA, RL). Hors cadre!

Mésange bleue (*Parus caeruleus*): 1 individu les 6 et 21 février à Zermatt où l'espèce ne se reproduit pas (J. Strahm). Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*): 2 le 14 février à Zermatt (J. Strahm). Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*): 1 aux marais de St-Pierre-de-Clages le 19 janvier. Niverolle (*Montifringilla nivalis*): fait nouveau selon R.-P. Bille, l'espèce fréquente en nombre le village de Chandolin. Une vingtaine le 7 février (J. Burnier). Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*): 30-40 le 24 décembre à 2000 m sur Verbier (RA), dernier le 1^{er} avril à Gettwing (RA, SV). Venturon montagnard (*Serinus citrinella*): cris le 18 janvier à Branson. Seule donnée hivernale (RA). Chardonneret (*Carduelis carduelis*): 10 le 22 décembre à Martigny (RA). Tarin (*Carduelis spinus*): hivernage très abondant. Beccroisé des sapins (*Loxia curvirostra*): 1 mâle chanteur et 1 femelle en activité de construction à 1800 m sur Lourtier le 29 décembre (RA, RL). Bruant zizi (*Emberiza cirius*): 1 dizaine d'hivernants à Vétroz (RL); 2 le 6 janvier à Saillon; 1 femelle le 13 janvier à Branson (RA). Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*): 3 au bord d'un canal à Châteauneuf les 19 et 20 janvier (FC).

Migration et erratisme: printemps-automne 1980

Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*): 3 individus le 22 avril à Agarn (FC); 1 le 16 avril à Branson (GT); 2 le 26 avril à Fully (PR). Aigrette garzette (*Egretta garzetta*): 2 le 11 mai à Monthey (RD); 3 le 12 mai à Grône (RL); 1 le 13 mai à Martigny (PR); 1 le 16 mai à Evionnaz (PR); 5 le 27 mai à Branson (RA); 3 le 28 mai à Branson (RA). Héron cendré (*Ardea cinerea*): 3 le 30 mars et 2 le 21 avril à Grône (FC), observations fréquentes dans la région de Martigny. Héron pourpré (*Ardea purpurea*): 1 le 20 mai à Martigny (PR); 1 le 4 mai aux Iles de Sion (RL).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*): 1 le 3 septembre à Martigny (PR). Canard siffleur (*Anas penelope*): 1 mâle le 29 mars à Grône, 1-2 le 3 avril à Agarn (RL). Canard chipeau (*Anas strepera*): 1 couple les 30-31 mars à Grône (FC); 8 le 19 avril à Saillon (RA). Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*): 3 le 30-31 mars à Grône (FC); 4 le 22 avril à Agarn (FC). Canard pilet (*Anas acuta*): 1 mâle le 19 octobre à Grône (RL). Sarcelle d'été (*Anas querquedula*): 1 couple les 30-31 mars à Grône (FC).

Canard souchet (*Anas chlypeata*): 1 femelle le 27 avril à Fully (PR); 1 mâle le 29 mars à Grône; 3 couples le 19 avril aux Iles (RL). Nette rousse (*Netta rufina*): 5 les 30-31 mars à Grône (FC, RA, SV); 4 du 26 mars au 2 avril à Grône; 1 le 10 avril (RL); 5 le 1^{er} avril à Agarn (RA, SV). Fuligule milouin (*Aythya ferina*): 13 les 30-31 mars à Grône (FC); max. à Grône: 15 le 29 mars (RL); 10 le 2 avril; 1 le 1^{er} avril puis un autre le 22 à Agarn (RA, SV). F. morillon (*Aythya fuligula*): 3 le 24 avril à Grône; 1 couple le 3 avril à Agarn (RL). F. milouinan (*Aythya marila*): 1 mâle le 29 mars à Martigny (RA, PR, A. Ducrey). Harle piette (*Mergus albellus*): 2 le 25 mars sur le Rhône à Fully, apparition inhabituelle! (RA). Harle bièvre (*Mergus merganser*): 6 à 8 individus le 29 mars vont passer la nuit dans les fortifications militaires aux Follaterres (RA, PR).

Milan noir (*Milvus migrans*): première observation de l'année le 26 mars à Fully (RA). Milan royal (*Milvus milvus*): 1 le 16 mars aux Follaterres (PR, RA); 1 le 26 mars au coteau du Rosel à Dorénaz (NJ, RA). Circaète (*Circus gallicus*): 1 le 20 avril à Fully (PR), sous réserve d'homologation! Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*): 1 femelle ou juv. le 3 avril, un autre le 22 à Agarn (RL, FC); 2 femelles le 21 avril à Grône (FC); 1 le 17 avril à Finges (RL). Busard cendré (*Circus pygargus*): 1 mâle le 1^{er} avril à Agarn (RA, SV); 1 femelle le 11 mai et une autre le 18 mai à Fully (RA); 1 mâle à Vétroz le 30 avril (RL). Balbuzard (*Pandion haliaetus*): 1 le 17 mai à Aproz (NJ); 1 le 21 septembre au col de Balme; 1 migre le 11 avril vers l'aval de la vallée du Rhône, vers 1900 m au-dessus de Fully (PR, RL, RA). Faucon hobereau (*Falco subbuteo*): 1 le 20 avril à Bramois (RL). Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*): entre autres: 1 mâle adulte très peu farouche, concentré sur sa proie porteur d'une bague rouge à la patte droite le 26 avril à Martigny (RA); une femelle juv./immature le 23 juillet dans le massif des Combins à 2500 m (RA).

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): 6 les 15-16 février à Martigny (RA); 6 le 23 février à Châteauneuf (RA); 1 le 15 juin à Agarn (RL, COL); 4 le 30 novembre à Bramois (RL). Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*): 1 le 27 avril à Martigny (RA); 1 le 8 mai à Martigny (PR). Courlis cendré (*Numenius arquata*): 4 individus dans un pré près d'Agarn le 22 avril. Ils pâturent en compagnie de 3 craves! (FC). Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*): 1 du 23 au 27 avril à Martigny (RA). Chevalier gambette (*Tringa totanus*): au max. 11 du 23 avril au 12 mai à Martigny (PR, RA); 1 le 23 avril à Vétroz (RL). Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*): 2 du 24 avril au 11 mai à Martigny (PR, RA); 1 le 28 août à Martigny (RA). Chevalier culblanc (*Tringa ochro-*

pus): 3 le 1^{er} avril à Agarn (RA, SV); 1 le 27 avril à Martigny (RA); 1 le 28 août à Martigny (RA). Chevalier sylvain (*Tringa glareola*): 2 les 12 et 13 mai à Martigny (RA). Guifette noire (*Chlidonias niger*): 3 les 4 et 26 mai aux Iles de Sion; 3 le 12 mai à Grône (RL); 5 le 15 (JCP). Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*): 1 le 15 mai à Grône (JCP). Tourterelle des bois (*Streptopelia decaocto*): première le 26 avril à Fully (RA). Chouette effraie (*Tyto alba*): 1 individu le 15 mars à Fully en vol nocturne (RA). Martinet noir (*Apus apus*): 1^{er} le 5 mai à Fully où le max. du passage est noté le 18 mai (RA). Martinet alpin (*Apus melba*): 1^{er} le 29 mars à Grône (RL). Martin pêcheur (*Alcedo atthis*): 1 erratique le 17 août au Châble, 820 m (SV). Huppe fasciée (*Upupa epops*): 1^{re} le 2 avril à Agarn (RA, SV). Torcol (*Jynx torquilla*): 2 chanteurs le 7 avril à Fully (RA).

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*): 1^{re} le 31 mars à Poutafontane (RA, SV). Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*): 1^{re} le 20 février déjà aux Follatères (RA); un groupe d'une dizaine d'individus arrivés le 6 mars, survit à la vague de froid qui sévit à mi-mars (20 cm de neige en plaine) (RA). Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*): 1^{re} le 21 mars à Branson (RA), dernières le 13 novembre à Branson (RA). Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*): dernière le 6 novembre à Branson (RA). Pipit rous-seline (*Anthus campestris*): 5 le 22 avril à Agarn (FC). Pipit des arbres (*Anthus trivialis*): 1^{er} le 19 avril à Fully (RA). Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*): encore 3 migrateurs (en mue) le 31 mai à Vétroz où elle pourrait nicher (RL). Rossignol (*Luscinia megarhynchos*): 1^{er} le 19 avril à Fully (RA). Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*): déjà un migrateur le 13 août en plaine de Charrat (RA). Traquet tairier (*Saxicola rubetra*): encore 2 tardifs le 10 octobre à Martigny (RA). Locustelle tachetée (*Locustella naevia*): 3 le 18 mai à Fully/Martigny (RA); 1 chanteur à 850 m à Savièse le 7 mai; 1 chanteur le 18 mai à Vétroz (RL). Locustelle lusciniôide (*Locustella luscinioides*): 1 le 30 avril à Martigny (RA). Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*): 1 mâle à nouveau le 8 mai à Martigny (PR); les observations sont de plus en plus fréquentes ces dernières années et dénoteraient une expansion de l'espèce au nord des Alpes. Egalement sous réserve d'homologation.

Tichodrome (*Tichodroma muraria*): 1^{er} en plaine le 22 octobre, aux Follatères (RA). Mésange rémiz (*Remiz pendulinus*): 1 individu le 28 avril à Martigny (PR). Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*): 1 immature le 30 août à Agarn (GT). Pie-grièche rous-se (*Lanius senator*): 1 le 6 mai en gare d'Orsières (PAO). Crave à bec rouge (*Pyrrhocorax graculus*): 3 ind. dans un pré d'Agarn pâturent en compagnie de 4 Courlis cendrés (FC). Niverolle (*Montifringilla nivalis*): 1 vol de 15 à 20 ind. et un autre d'environ 100 le 6 avril à Evolène; 1 vol de 20 à 30 le 10 avril à Zinal (PAO). Venturon (*Serinus citrinella*): 5 à 10 le 22 février à Vex annoncent le retour printanier (RA, SV); encore 20 le 26 avril en plaine de Fully (RA). Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*): 1^{ers} le 26 avril, puis des ind. les 17 et 25 mai à Fully (RA, SV).

Printemps et été 1980: indices de nidification

Milan noir (*Milvus migrans*): 2 couples nicheurs à Fully; 1 couple nicheur à Sail-lon (Gdj., VS); 4 nids le 23 avril à Collombey-Muraz dont 1 à trois jeunes (RD). Aigle royal (*Aquila chrysaetos*): entre autres: l'aire de Champéry contient encore 2 aiglons le 6 août (RD).

Perdrix grise (*Perdix perdrix*): 15 juvéniles (presque adultes) à Vétroz (RL). Caille des blés (*Coturnix coturnix*): 1 le 18 mai à Martigny (RA).

Rôle d'eau (*Rallus aquaticus*): à nouveau des nicheurs à Finges (FC). Poule d'eau (*Gallinula chloropus*): 1 nid à 4 œufs le 30 mai au canal de Fully (PAO). Petit Gravelot (*Charadrius dubius*): 2 couples installés dès le 10 avril dans deux gravières à Martigny (RA). Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*): env.40 le 16 mai à Bouveret; 20 le 5 avril aux Barges/Vouvry (RD). Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*): 1 le 15 juin à Agarn (RL).

Moyen-duc (*Asi otus*): 1 nid à 5 œufs le 11 avril à Saillon donne 3-4 juvéniles (SV). Martin pêcheur (*Alcedo atthis*): à nouveau 1 couple nicheur aux étangs de Finges; 2 couples dans la région de Poutafontane (FC). Huppe fasciée (*Upupa epops*): à Fully et environs sur une distance de 9,5 km, (secteur légèrement inf. à 1979) RA note: 18 couples certains, 2 probables et 2 possibles, 4 à 6 couples nichent en plaine dont 2 seulement sur la rive gauche du Rhône; 14 à 16 nichent sur le coteau; 7 nids ont été découverts, dont 3 ont un contenu accessible ou visible: 1 nichée en nichoir: 4 juv. + 4 œufs stériles, 1 nichée avec au moins 2 œufs et 3 jeunes détruite par l'installation d'un essaim d'abeilles (+R. Brun), 1 nichée avec au moins 3 jeunes (RA); à noter 2 ind. le 6 mai à Monthey où l'espèce ne niche probablement plus (RD). Pic épeichette (*Picoides minor*): observé en juin à Rarogne (B. Michellod).

Alouette lulu (*Lullula arborea*): au moins 7 sites connus sur le territoire de la commune de Fully le long de 6 km de coteau de rive droite du Rhône; une seule preuve de nidification pour 1980: famille à 3 jeunes le 21 juillet à 750 m. Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*): 1 en plumage nuptial le 1^{er} juin à Agarn (RL). Rossignol (*Luscinia megarhynchos*): à mi-juin dans la région de Fully, la plupart des couples cantonnés sur les berges du Rhône eurent leurs nichées détruites par une crue subite. Traquet pâle (*Saxicola torquata*): 10 à 12 couples (10 certains, 2 probables ou possibles) cantonnés sur 2,7 km de rive droite du Rhône entre les Follaterres et Branson. Soit: 3 à 4 couples installés en plaine dans les friches. 7 à 8 couples dans le coteau (vignes et steppes) ce qui nous donne une densité de: 1 couple pour 10 à 13 ha en plaine, 1 couple pour 8,5 à 10 ha sur les bas-versants. Remarque: de nombreux couples cantonnés habituellement en plaine, sur les digues du Rhône, se sont installés cette année sur le coteau. Quelle pourrait en être la raison? (RA); 3 chanteurs dans la plaine de Châteauneuf-Conthey le 16 mai (NJ). Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*): les chanteurs qui se font de plus en plus nombreux dans la région de Fully disparaissent ou se taisent dès le 10 juin pour la plupart: seulement 2 preuves de nidifications: 1 couple est affairé à la construction de son nid le 5 juillet aux Follatères, en bordure de la chênaie buissonnante. Le 28 juillet, le nid contient 2 jeunes en peignes et 1 œuf infécond. Le 9 juillet, 2 adultes nourrissent au moins 2 jeunes dans une friche buissonnante à Vernayaz.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*): 1 mâle chanteur aux Mayens de Sion, 1200 m (PAO); 1 mâle chanteur au col des Planches le 25 mai, 1350 m (PAO). Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*): 4 adultes nourrissent 10 jeunes au nid le 25 mai en plaine de Saillon (RA, SV). Grand Corbeau (*Corvus corax*): 1 couple construit au printemps 1980 vers 2150 m dans le Val d'Arolla. Le nid le plus haut du Valais (M. Gaspoz). Moineau friquet (*Passer montanus*): 1 couple ébauche son nid dans une ancienne aire de Milan noir sur un aulne à 5 m de haut le 30 mars (FC). Tarin (*Carduelis spinus*): l'abondance des observations tard dans la saison est à mettre en relation avec la fréquence de l'espèce durant l'hiver: fin avril: 1 chanteur à Saxon, 1000 m; 6 mai: 1 à Champex; 25 mai: 1 au Col des Planches, 1250 m; 3 juin: trois à Itravers, 1350 m (PAO).

